ANALYSEN

GUTACHTEN

BERATUNGEN

aktuelle Kurzinformationen zu

Gentechnisch verändertem Raps

Ziele der „Grünen Gentechnik“ ...

- ◆ Schädlingskontrolle
- ◆ Trocken-,
- ◆ Säure-,
- ◆ Temperatur-
- ◆ & Salztoleranz
- ◆ Verbesserung des Nährstoffgehalts & Verarbeitungsqualität
- ◆ Ω -3-Fettsäuren-, Zuckergehalts, Farbe
- ◆ Industrierohstoffe (biologisch abbaubares Plastik, Schmieröle)
- ◆ Pharmazeutische Produkte (Hormone, Impfstoffe oder Antikörper)

www.biosicherheit.de

Enthält das Produkt überhaupt GVO?

Screening-Verfahren:

- ◆ Vorhanden in unterschiedlichen gv Pflanzen!
- ◆ Selektionsgene (z.B. Resistenzgene)
- ◆ Promotoren = Sequenz zur Expression eines Gens (Transkription), z. B. 35S-Promotor aus dem Blumenkohlmosaikvirus, P35S
- ◆ Terminatoren = Beendigung der Transkription, z. B. NOS-T. aus *Agrobacterium tumefaciens*, T-nos

Strategien zum Nachweis gentechnisch veränderter Pflanzen mittels PCR

Ablauf der Analytik

Probenvorbereitung
Homogenisation

DNA-Extraktion

Real-time PCR Analyse

Interpretation der
Ergebnisse

PCR – „Zutaten“

Template = isolierte DNA

Primer

Taq DNA-Polymerase

[cgg.vital-it.ch/ icons/taq.polymerase.jpg](http://cgg.vital-it.ch/icons/taq.polymerase.jpg)

Ablauf einer PCR I

1. Denaturierungsphase

2. Annealingphase

Ablauf einer PCR II

3. Elongationsphase

Reaktion der PCR

Aus 1 Kopie werden nach 38 Zyklen $2^{38} = 274.877.906.944$ Kopien

„Real-Time“-PCR

- ◆ „Real Time“ = „in Echtzeit“
- ◆ PCR plus Fluoreszenzfarbstoffe = Fluoreszenz

- ◆ proportionale Fluoreszenzzunahme mit PCR-Produktmenge
- ◆ Möglichkeit der Quantifizierung
- ◆ spezifische Sondensysteme
 - ✓ TaqMan

spezifische Sonde - TaqMan Sonde

Prinzip:

1. Annealingphase

2. Elongation: Sonden-Entfernung

3. Ende der Polymerisation

Auswertung mittels Amplifikationsplot

Je weniger DNA in der Probe desto höher ist der C_T -Wert!

Quantitative Analyse

Nachweissonde für Raps

Raps-DNA

4 Raps-DNA-Moleküle

Nachweissonde für GVO

Gentechnisch veränderte DNA

1 gentechnisch verändertes
DNA-Molekül

Probe enthält 25% GVO

Quantitative Real-time PCR

Berechnung eines Messwertes

Messwert

Was ist Multiplex PCR?

- ◆ Kombination mehrerer PCR Systeme in einer Reaktion
- ◆ Gleichzeitige Amplifikation unterschiedlicher Sequenzen

PCR System 1

PCR System 2

PCR System 3

Detektion über verschiedene Fluorophore

Multiplex Systeme Raps

- ◆ **Raps spezifisches Referenzsystem (Gen CruA)**

Multiplex I:

- ◆ Nos-Terminator = aus *Agrobacterium tumefaciens*
- ◆ 35S-Promoter = Pro. des Blumenkohlmosaikvirus
- ◆ CaMV = Blumenkohlmosaikvirus – „Schädling“

Multiplex II:

- ◆ FMV Promoter = 35S Promotor
Braunwurz-Mosaicvirus
- ◆ bar Gen = Herbizidresistenz
- ◆ pat Gen = Herbizidresistenz
- ◆ CTP2 & CP4 EPSPS = Herbizidresistenz

Farben	Anregung/ Detektion [nm]
Blau	365/470
Grün	470/510
Gelb	530/555
Orange	585/610
Rot	625/660
Crimson	670/710

Screening Tabelle

Name of Event	Plant	Authorization EU	P35S		T-nos		CTP2-CP4 EPSPS		bar		35S-pat		FMV	
23-198, 23-18-27 (Laurical)	rape	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-		
Falcon GS40/90	rape	A	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
GT200	rape	-	-		-		+		-		-		+	
GT73	rape	A	-	-	-	wp	+	+	-	wp	-	-	+	+
HCN 10, HCN 92, Topas19/2 (LibertyLink)	rape	A	+	+	-	wp	-	-	-	-	+	+		
Liberator L62 (pHoe6/AC)	rape	A	+		-		-		-		+			
MS1, RF1, RF2; MS1xRF1 (PGS1) MS1xRF2 (PGS2) (SeedLink)	rape	A	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-		
MS8, RF3, MS8xRF3 (SeedLink)	rape	A	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
OXY 235	rape	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-		-	-
Phy 23	rape	-							+		-			
PHY36	rape	-	-		-		-		+		-			
T45, HCN 28 (LibertyLink)	rape	A	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+		